

FORMULAIRE

Prévention des infections



Absence chez l'employé présentant des symptômes de la COVID-19, de l'Influenza ou de la gastro-entérite

Installation :

- CHSLD Heather CHSLD des Moulins CHSLD Émile McDuff
 CHSLD Louise-Faubert CHSLD Marguerite-Rocheleau CHSLD Michèle-Bohec

Prénom et nom : _____ N° d'employé : _____ Unité : _____

Date de début de symptômes : _____ Date d'exposition possible avec un cas : _____

INFLUENZA

Tableau clinique

Les symptômes classiques de la grippe sont la fièvre élevée et la toux débutant soudainement. Ils peuvent être accompagnés de myalgies (douleurs musculaires), de frissons, d'écoulement nasal, de mal de gorge, de céphalées et de fatigue importante.

Indication

- Retirer du travail 5 jours et retour si absence de fièvre depuis au moins 48 heures.
 Port du masque au retour si présente encore des symptômes.

GASTRO-ENTÉRIQUE

Tableau clinique

Au moins 3 selles liquides ou semi-liquides par période de 24 heures ou selles plus abondantes et plus fréquentes que d'habitude, crampes abdominales, nausées, vomissements.

Indication

- Retrait 3 jours et 48 heures après la fin des symptômes.

COVID-19

Tableau clinique

Présence de fièvre, toux, mal de gorge dyspnée ou perte de goût et odorat accompagné soit de douleur musculaire, congestion nasale ou symptômes gastro-intestinal.

Indication

- Isolement et demander un test de dépistage.
 Si positif, retirer du travail 5 jours. RAT au 6^e jour et port du masque jusqu'au 10^e jour.
 ** **Attention** si l'employé a eu la COVID ≤ 60 jours ou négatif et présente des symptômes, envisager un autre diagnostic (SAG, influenza ou autres) **

Contact étroit asymptomatique

- Aucun retrait, port du masque et surveillance des symptômes 7 jours. Veuillez vous référer au document résumé sur les mesures PCI-COVID 19.